

2か月になったら
始めましょう♪♪

柏崎市 乳幼児の予防接種スケジュール一例

2025.4~

子育て支援課家庭支援係


| ワクチン名 | 生 | 不活化 | 定期 | 任意 | 年齢 | | | | | | | | | | | 注意事項 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----------------------------|-----|-------------|---------------|--|-----|-----|-----|-----------------------------|------|------|--|------------|----|---|--------------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | 誕生 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | | 11か月 | 1歳~1歳5か月 | 1歳6か月~11か月 | 2歳 | 3歳 | | | | | |
| ロタウイルス | 生 | | 定期 | | | | ① | ② | ③ | ④ | 両ワクチンとも、出生6週0日から14週6日までに1回目接種を行う。最終回は、ロタリックス24週0日、ロタテック32週0日までに。 | | | | | | | | | | | 両ワクチンとも、①~②(~③)は27日以上の間隔をおいて接種 | | | | |
| 小児用肺炎球菌 | 不活化 | | 定期 | | | | ① | ② | ③ | 60日後、かつ、1歳から | | ④ | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ①~③は27日以上の間隔をおいて接種 接種開始が遅れた場合や接種間隔が大きくあいた場合、接種回数が異なるので要相談! 公費助成は5歳未満まで | | |
| B型肝炎 | 不活化 | | 定期 | | | | ① | ② | ①を接種後139日以上 | | ③ | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ①は生後2か月以降、②は①の接種から27日以上、③は①の接種から139日以上の間隔おく 公費助成は1歳未満まで | | | |
| 五種混合 (ジフテリア・百日せき 破傷風・不活化ポリオ・ヒブ) | 不活化 | | 定期 | | | | ① | ② | ③ | ※ 6か月~18か月あける | | ④ | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ①~③は20日から56日までの間隔をおいて接種 公費助成は7歳半未満まで | | |
| B C G (結核) | 生 | | 定期 | | | | | | ① | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 標準的な接種期間は生後5~8か月の頃 公費助成は1歳未満まで | | | | | |
| M R (麻しん風しん混合) | 生 | | 定期 | | | | 予防接種初回セット： 生後1か月前後に郵送します | | | | ① | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 公費助成は2歳未満まで 2回目の接種は小学校入学前の1年間(年長児のとき) | | | |
| 水痘 (みずぼうそう) | 生 | | 定期 | | | | | | | | | ① | ② | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ①②は3か月以上(標準的には6~12か月)の間隔をおいて接種 公費助成は3歳未満まで | |
| 日本脳炎 | 不活化 | | 定期 | | | | | | | | | | ① | ② | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 1期(3歳~)は6日以上、標準的には28日までの間隔をおいて2回接種し、初回接種終了後6か月以上(標準的には1年を経過した時期)で追加接種 2期は9歳時に1回接種 |
| おたふくかぜ | 生 | | 任意 | | | | | | | | | | | | ※1歳から接種可 | | | 2回の接種により発症予防効果が高くなる。追加接種は1回目接種から3~4年後が有効 | | | | | | | | |
| インフルエンザ | 不活化 | | 任意 | | | | | | | | | | | | ※生後6か月~13歳未満は2~4週間隔をあけ、2回接種 | | | 生後6か月から接種可。毎年10月頃から接種が開始される | | | | | | | | |

生 : 生ワクチン

不活化 : 不活化ワクチン

定期 : 無料(県外で定期予防接種を実施した場合は自己負担。ただし、償還払制度あり)

任意 : 有料(自己負担) ※任意接種の費用については、かかりつけの医療機関にお問い合わせください

 : 定期予防接種の接種推奨年齢

 : 定期予防接種の接種可能年齢

 : 任意予防接種の接種可能年齢

【異なるワクチンの接種間隔の見直しについて】
定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から接種間隔の一部が見直されることとなりました。
すくすくネットかしわざきのQRコードから確認できます。



柏崎市 LINE公式アカウント



友だち追加 予防接種を公費助成(無料)で受けられる期間の終了が近づいたら、お知らせします。